

※ 중증열성 혈소판 감소 증후군(SFTS)관련 주의사항 당부

구 분	내 용
감염경로	▫ 주로 SFTSV에 감염된 진드기에 물려서 감염, 환자 혈액 및 체액에 대한 직접적 노출에 따른 전파 가능성 존재 ▫ 주요 매개체 : 작은소피참진드기(<i>Haemaphysalis longicornis</i>)
사진	
잠 복 기	▫ 6-14일
주요증상 및 경과	▫ 38℃ 이상의 고열과 위장관계 증상(오심·구토, 설사, 식욕부진 등) ▫ 출혈성 소인, 다발성장기부전 및 사망에 이르기도 함 - 혈소판·백혈구 감소에 따른 출혈성 소인(혈뇨, 혈변 등) 발생 - 피로감, 근육통, 말어눌·경련·의식저하와 같은 신경학적 증상 동반 - 다발성장기부전 동반 가능 ▫ 주요 검사소견 - 백혈구 및 혈소판 감소 - 혈청효소 이상 : AST, ALT, LDH, CK 상승
예방수칙	1 ▶ 긴팔, 긴바지, 모자 등을 착용하고 소매는 단단히 여미고 바지는 양말 속으로 넣어 피부노출을 최소화합니다.  2 ▶ 야외활동 및 작업 시 진드기 기피제를 사용합니다.  3 ▶ 풀밭 위에 돛자리를 펴서 앉고, 사용한 돛자리는 세척하여 햇볕에 말린 후 보관합니다.  4 ▶ 외출 후 옷은 반드시 세탁하고, 샤워나 목욕을 합니다.  5 ▶ 머리카락, 귀 주변, 팔 아래, 허리, 무릎 뒤, 다리 사이 등에 진드기가 붙어있지 않은지 꼼꼼히 확인합니다. 
당부사항	진드기에 물렸을 경우 이렇게 하세요!! 대부분의 진드기는 피부에 단단히 고정되어 손으로 무리하게 당기면 진드기 일부가 피부에 남아있을 수 있으므로 핀셋 등으로 깔끔히 제거하고, 해당 부위를 소독 받는 것이 좋으며, 필요시 가까운 의료기관을 방문합니다.  진드기 제거법 ※ 물린 상태에 있는 진드기는 핀셋을 이용하여 비틀거나 회전하지 않도록 주의하여 천천히 제거합니다.  • 진드기에 물린 후, 고열, 구토, 설사 등의 증상이 나타나는 경우 병원에 내원하여 진료를 받으십시오.